

Bordereau confrontation CMV23-3

Nombre d'inscrits: 58

Saisie de vos résultats :

Connectez-vous sur le site www.abiopratt.fr.

Munissez-vous de votre identifiant ainsi que du mot de passe

Vos résultats sont à saisir directement sur le site, à partir du menu Accueil « Mes Confrontations » dès le 21/09/2023.

Vous pourrez revenir sur votre saisie jusqu'à la date limite : 23/10/2023 à minuit

SEROLOGIE CMV

PRESENTATION DE L'ENVOI

Echantillon : CMV23-3A

Echantillon de sérum à conserver au réfrigérateur (2°-8°C)

Date limite d'utilisation : date de clôture de la confrontation.

Les échantillons sont à manipuler selon les recommandations en vigueur en matière de produit potentiellement infectieux et conformément aux Bonnes Pratiques de Laboratoire.

Homogénéiser l'échantillon puis le centrifuger à 3000 tours pendant 5 minutes.

Après usage, suivre votre procédure interne d'élimination des échantillons des patients

CAS CLINIQUE

Une femme enceinte bénéficie d'une sérologie CMV à 16 SA. Vous n'avez aucun renseignement clinique particulier à son sujet.

En fonction de vos résultats, quelle conclusion vous semble la plus appropriée ?

CMV23-3A Sérum

Ac anti IgG ou Totaux

Trousse utilisée *

Résultat qualitatif *

- ☐ Positif
☐ Négatif
☐ Douteux
☐ Non rendu

Résultat quantitatif *

Ac anti IgM

Trousse utilisée *

Résultat qualitatif *

- ☐ Positif
☐ Négatif
☐ Douteux
☐ Non rendu

Résultat quantitatif *

Conclusion

En fonction de vos résultats, quelle conclusion vous semble la plus appropriée ? *

- ☐ Pas d'interprétation
- ☐ Absence d'IgG, absence de marqueur d'infection récente
- ☐ Patient(e) protégé(e), absence de marqueur d'infection récente
- ☐ Patient(e) immunisé(e), absence de marqueur d'infection récente
- ☐ Résultat des IgG spécifiques : équivoque / douteux : patient(e) à considérer comme immunisé(e)
- ☐ Résultat des IgG spécifiques : équivoque / douteux : patient(e) à considérer comme non immunisé(e)
- ☐ Primo infection à CMV
- ☐ Résultats compatibles avec une primo-infection à CMV à interpréter en fonction des autres résultats sérologiques (EBV, toxoplasmose...)
- ☐ Primo-infection à CMV exclue
- ☐ Réinfection /réactivation à CMV
- ☐ Nouvelle sérologie à effectuer dans 8 à 15 jours pour infirmer ou confirmer une primo-infection à CMV
- ☐ Nouvelle sérologie (IgG-IgM), à effectuer dans 3 semaines/1 mois, nécessaire pour infirmer ou confirmer une primo-infection à CMV
- ☐ Mesure de l'avidité des IgG anti-CMV nécessaire pour infirmer ou confirmer une primo-infection à CMV
- ☐ Primo-infection à CMV post-conceptionnelle
- ☐ Primo-infection à CMV post-conceptionnelle exclue
- ☐ Sérologie CMV (IgG-IgM) sur un sérum du début de grossesse, souhaitée
- ☐ Recherche de l'ADN viral sur le liquide amniotique, recommandée
- ☐ Infection congénitale à CMV
- ☐ Infection congénitale à CMV exclue
- ☐ Infection congénitale à CMV liée à une réinfection/réactivation maternelle
- ☐ Recherche du CMV (PCR), dans les urines du bébé, nécessaire pour conclure

Commentaires